

服用時請務必閱讀本說明書。并請妥善保管以便必要時可再閱讀。



軟便・腹瀉・消化不良

正露丸糖衣 A[®]

第2類醫藥品

腸胃藥

腸胃藥 正露丸糖衣 A 是一百年前起受青睞至今的正露丸的姊妹產品，是家家戶戶(5歲以上)使用的居家常備藥。日本藥典木餹油為天然成分，在不停止腸道運動的同時調整腸內水分的平衡，從而發揮其功效。特別對由於食物或飲水而引起的腸胃不適，消化不良時的軟便、腹瀉以及精神壓力、感冒等引起的軟便、腹瀉等功效顯著。本藥為白色片劑，主要成分為日本藥典木餹油，并配合老鶴草粉及黃柏干浸膏等生藥。

[使用時的注意]



禁止事項



[不遵守以下事項會造成現在的症狀進一步惡化，或容易引起副作用、事故]

- 以下情況者請勿服用。
 - 至今為止因服用本藥或曾由本藥成分引起過敏症狀者（皮膚發疹、發紅、發癢、浮腫等）
 - 不滿5歲的乳幼兒（有堵塞喉嚨的危險）
 - 接受人工透析治療者
- 在服用本藥期間，請不要服用其他的止瀉藥。
- 請不要長期連續服用。
- 請勿將本藥用于【功效】以外的目的。

諮詢事項



- 以下情況者在服用本藥之前請向醫師、牙科醫師、藥劑師或註冊銷售員諮詢。
 - 正在接受醫師或牙科醫師治療者
 - 伴隨發熱的腹瀉，大便帶血、或帶黏液并持續者
 - 孕婦，可能妊娠或正處哺乳期者
 - 高齡者
 - 本人或父母、兄弟姐妹中有過敏體質者
 - 因藥物或化妝品等曾引起過敏症狀者
 - 有肝臟或腎臟疾患者
- 服用后，如發生以下情況有可能為副作用，請立即停止服用，并持本說明書向醫師、牙科醫師、藥劑師或註冊銷售員諮詢。

有關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢、浮腫
消化器官	惡心、嘔吐、便秘、食欲不振、胃部不適
精神神經系統	頭暈、頭痛

- 連續服用數日（大體的基準為5~6日）症狀仍無改善時，請停止服用，并持本說明書向醫師、牙科醫師、藥劑師或註冊銷售員諮詢。

[功效]

軟便，腹瀉，因食物或飲水引起的腹瀉，上吐下瀉，瀉肚，因消化不良引起的腹瀉

（請繼續閱讀背面內容）

[用法・用量]

請在飯後（盡量于 30 分鐘以內）務必用涼開水或溫水服用以下用量。

年齡	單次服用量	1 日服用次數
成人（15 歲以上）	4 片	3 次
11 歲以上，未滿 15 歲	3 片	
5 歲以上，未滿 11 歲	2 片	
未滿 5 歲	請勿服用	

[有關用法・用量的注意]

- (1) 請務必遵守規定的用法・用量。
- (2) 在給 5 歲以上的兒童服用時，為了避免弄錯使用量或藥丸堵塞喉嚨，應在保護者的指導監督下使用。

[成分・分量]

12 片（成人在 1 日之內的最大服用量）中含有如下成分。

成分	分量	功能
日本藥典木餚油*	270mg	使大腸的過度的蠕動運動恢復正常，調整腸管內水分，腸內靜菌
日本藥典老鸛草粉	300mg	調整腸道運動
黃柏干浸膏	300mg	健胃作用，腸內靜菌

作為添加物，還含有硅酸鋁酸鎂、合成硅酸鋁、甲基纖維素、低取代羥丙基纖維素、羧甲基纖維素鈣、硬脂酸鎂。此外，糖衣層含有白糖、粉狀阿拉伯膠、明膠、滑石粉、碳酸鈣、氧化鈦、羧甲基纖維素鈉、聚乙二醇 6000、巴西棕櫚蠟、白蜂蠟。

*一般來講，被稱為焦油的物質除可以指日本藥典木餚油（CAS Reg. No. 8021-39-4）以外，還可以指從煤炭中提取的工業用焦油（煤焦油）（CAS Reg. No. 8001-58-9）。兩者的原料、成分及用途都不同，是完全不同的物質。（CAS Reg. No. 為化學物質的固有的註冊號碼）

關於本公司產品的文獻以及詳細內容，可參考公司網站(<http://www.seirogan.co.jp>)或者詢問公司顧客諮詢處。

[保管及使用上的注意]

1. 請保管在小兒之手無法觸及之處。
2. 為了避免誤用及保持品質，請絕對不要調換放入其他容器內。
3. 請絕對不要把本藥和其他藥劑混合。
4. 本藥為白色有光澤的片劑。開封后要蓋緊瓶蓋，避免日光直射，并盡可能保存于陰涼處。此外，片劑偶有失去光澤或稍微變色的現象，但對使用無任何影響。
5. 瓶內的充填物是為防止在運輸中片劑破損而放入的。開封后可丟棄。
6. 如受到強烈撞擊片劑有可能會破裂。
7. 請勿使用超過使用期限的產品。

如果因為使用本藥出現異狀或有其他疑問時，請和購買的藥店或下記部門聯繫。

大幸藥品株式會社 顧客諮詢處 電話：06-6382-1095

諮詢時間：上午 9 時～下午 5 時（星期六、日和節假日除外）

關於副作用受害救濟制度的諮詢：（獨）醫藥品醫療器械綜合機構 電話：0120-149-931

製造及銷售廠商



大幸藥品株式會社

郵編 564-0032 日本國大阪府吹田市內本町 3 丁目 34 番 14 號