


販賣名稱

金冠



使用前請詳細閱讀此說明書。
並且請妥善保管。

外用鎮癢鎮痛消炎劑

第 2 類醫藥品

■使用注意事項■

絕對禁止事項(不遵守注意事項的話，會造成症狀惡化或容易產生副作用。)

- 1.請勿塗抹於以下部位。
 - (1)眼睛周圍、黏膜等部位。
 - (2)潰爛、受傷部位。
- 2.請勿將本液浸溼繃帶等覆蓋於患部上，否則恐怕造成皮膚潰爛。

■諮詢事項

- 1.有以下情況者使用前請諮詢醫師、藥師或登錄販賣者。
 - (1)正在接受醫師治療者。
 - (2)曾因服藥引起過敏症狀者。
 - (3)濕疹及皮膚嚴重潰爛者。
 - (4)皮膚較敏感脆弱者及嬰幼兒。
- 2.使用後發生以下症狀者，有可能是引發副作用，請立刻停止使用本藥劑，並攜帶此說明書與醫師、藥師或登錄販賣者諮詢。

部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、搔癢、過敏、潰爛、灼熱感

- 3.塗抹本藥劑 5~6 天後症狀沒有改善者，請停止使用本藥劑，並攜帶此說明書與醫師、藥師或登錄販賣者諮詢。

■適應症■

蚊蟲咬傷、紅癢、肩膀僵硬痠痛、腰痛、扭傷、跌打損傷

■用法及用量■ 一日數次適量塗抹於患部。

<用法及用量注意事項>

- (1)兒童使用時，請於家長的監護下協助使用。
- (2)請小心嚴防此產品誤入眼內。萬一不慎誤入眼內，請立刻用清水或溫水清洗。若症狀嚴重請至眼科接受治療。
- (3)此產品僅限於外用塗抹。誤食時，請以清水漱口。萬一不慎吞入，請儘速就醫。

◆使用方法

- 將海綿部輕輕抵於患部，使藥劑附著於患部上。
- 「適量塗抹於患部，待藥劑乾後再塗抹」，重複數次。

■成分及含量■（100mL 中）

氨水 21.3mL，薄荷醇 1.97g，樟腦 2.41g，水楊酸 0.57g，辣椒酊 0.35mL（相當於原藥量 35mg）
添加高麗人蔘萃取物，以酒精作為溶劑。

■保管及處理注意事項■

- (1)請置放於幼兒無法取得之處。
- (2)請密封並避免日光直射，保存於陰涼處。
- (3)溶劑當中含有酒精成分，請充分注意以下事項。
 - 請勿置放於電暖器等電器用品及火源附近，避免引起爆炸及火災。
 - 因車內溫度容易升高，請勿留置於車內。
 - 本劑接觸到塑膠類、化學纖維產品、皮革產品、家具、地板及其他有烤漆的物品時，有可能產生變色、變質情況。
- (4)請勿更換容器（避免誤用及品質變質。）
- (5)超過使用期限請勿使用。
- (6)開瓶後，不管使用期限為多久，請儘快使用。

請隨時將容器保持直立。

■消費者諮詢窗口■

TEL : 03-3421-6171[9:00~16:00 週一~週五（假日除外）]



台紙



玻璃：瓶

瓶蓋：PP

中蓋：PE

外包裝：PET

副作用被害救濟制度諮詢窗口
TEL 0120-149-931（免費專線）

嚴禁火氣

第二石油類



製造販賣者 株式會社 金冠堂

〒154-0024 東京都世田谷區三軒茶屋 1-34-14

<http://www.kinkan.co.jp>

K01T