

請保存此說明書供日後參考。服用之前請務必仔細閱讀此說明書。

樋屋兒童止咳藥水 S <止咳藥水>

指定第二类医药品

“樋屋兒童止咳藥水 S”是可紓解由不同原因引起的咳嗽、痰咳的止咳藥水。獲認可供年齡由 3 個月~ 15 歲未滿的兒童服用。

不含糖份(含木糖醇) 不含咖啡因 蜜瓜味-兒童容易入口的口味
無人造色素 防兒童開蓋設計

使用注意事項

(雖然 樋屋兒童止咳藥水 S 是兒童止咳藥水，服用時需採用一般止咳化痰藥水的注意事項)

[要避免] (不遵守以下事項可能導致感冒的症狀惡化或引起不良反應)

1. 本藥不應與下列藥物配合使用：含其它感冒藥，解熱劑和止痛劑，鎮靜劑，止咳化痰，或抗組胺藥（鼻腔粘膜炎，動暈症，或抗過敏劑，等口服藥物）口服藥物 2. 不要開車或服用本藥後操作機器。（本藥可能引起昏昏欲睡） 3. 哺乳期間停止服用本藥，或服用本藥時停止哺乳 4. 不要長時間服用本藥。

[請就以下情況諮詢醫生]

1. 有以下情況的人士，服用前請諮詢醫生、藥劑師或認可銷售代理：(1)正接受醫生或牙醫藥物診治(2)孕婦或有懷孕徵兆婦女 (3)年老長者 (4)有藥物過敏症狀記錄人士 (5)任何人有以下症狀：發高燒，排尿困難 (6)有以下病歷：心臟病，高血壓，糖尿病，青光眼，甲狀腺疾病，呼吸功能障礙，阻塞性睡眠呼吸暫停綜合症，肥胖

2. 本藥可能引起下列不良反應。如出現這些反應，應立即停止服用本藥，及帶同此說明書去諮詢醫生，藥劑師或認可銷售代理

皮膚：皮疹，紅腫，瘙癢 中樞神經系統：頭暈

消化器官：噁心，嘔吐，食慾不振 泌尿系統：排尿困難

在極少數情況下可能會出現以下嚴重症狀。在這種情況下，應立即求醫。

再生障礙性貧血：瘀斑，流鼻血，牙齦出血，發熱，皮膚蒼白和帶有黏液，乏力，心悸，氣促，感覺不適和頭暈，尿中有血等

粒性白血球缺乏症：突發高燒，發冷，咽喉疼痛等。

呼吸抑制：呼吸急促，感到氣喘

3. 服用本藥可能出現以下症狀。如果這些症狀持續或加重，請停止服用，並諮詢醫師，藥師，及帶同此說明書去諮詢醫生，藥劑師或認可銷售代理……便秘，口乾，昏昏欲睡

4. 如服用本藥 5~6 次後仍未見功效，立即停止服用本藥並帶同此說明書去諮詢你的醫生，藥劑師或認可銷售代理。

主治

咳嗽、喀痰

成份 (每 36 mL)

Dihydrocodeine phosphate...18 mg dl-Methylephedrine hydrochloride...45 mg

Potassium guaiacolsulfonate...162 mg Chlorpheniramine maleate...7.2 mg

添加物: Xylitol, D-sorbitol, Sodium chloride, Citric acid, Sodium citrate, Saccharin sodium, Sodium benzoate, Paraben, Propylene glycol, and flavor

用法與用量

11 歲以上至 15 歲未滿...6 mL 8 歲以上至 11 歲未滿...5 mL 5 歲以上至 8 歲未滿...3 mL 3 歲以上至 5 歲未滿...2.5 mL 1 歲以上至 3 歲未滿...2 mL 3 個月以上至 12 個月未滿...1 mL
3 個月未滿...禁止服用

每日三次，於飯後或睡前服用。視乎情況需要，一日最多可服用 6 次，每次需間隔 4 小時。

[注意事項] (1)請遵照建議劑量和服法。 (2)此藥應在成人監督下給兒童服用。 (3)12 歲未滿小童，服用前請諮詢醫生。

儲存和處理-注意事項

(1)請確保包裝密封，並儲存在陰涼乾燥的地方，避免陽光直射。 (2)請存放在孩童接觸不到的地方。 (3)為避免誤服及確保質量，切勿把此藥存放到另一個容器。 (4)切勿服用過期藥。 (5)為確保藥效，切勿服用開封後儲存過久的藥。

發售元

樋屋奇応丸株式会社

〒530-0043 大阪市北区天満 1-4-11

製造販売元

萬金藥品工業株式会社

〒634-0145 奈良県高市郡明日香村野口 317